

# Plus qu'une restauration dentaire.

## Une meilleure qualité de vie.

Un traitement avec des implants dentaires peut vous apporter à nouveau esthétique, confort et qualité de vie. Des dents qui ont le même aspect, offrent les mêmes sensations et fonctionnent comme vos dents naturelles, auront un impact positif sur votre confiance en vous et votre bien-être.

### **Améliorez votre capacité à manger, parler et rire**

Les implants dentaires permettent de retrouver les avantages et le sentiment de sécurité qui vont avec des dents saines et fortes. Offrez-vous le confort d'autrefois lorsque vous pouviez mordre dans cette pomme et rire sans complexe. Soyez à nouveau en confiance et insouciant(e) quand vous interagissez avec les autres, qu'il s'agisse d'une discussion professionnelle, amicale, familiale ou tout simplement de retrouver le plaisir d'un baiser.

### **Sourire est bon pour votre santé**

Les dents occupent un rôle central dans votre apparence physique. C'est pourquoi les restaurations (couronnes, bridges...) sur implants dentaires sont conçues pour s'harmoniser avec vos dents naturelles et vous rendre votre sourire.

### **Préservez votre apparence**

Les restaurations sur implants dentaires à l'apparence naturelle ne vous permettent pas seulement de retrouver un sourire confiant, elles renvoient également les forces de mastication à l'os de la mâchoire. Cela est vital pour une stimulation osseuse saine qui permet de préserver la forme de votre visage.

## LES IMPLANTS AIDENT À PRÉSERVER VOTRE STRUCTURE FACIALE

### Pourquoi l'os de la mâchoire a besoin des dents pour garder sa forme ?

Dans une bouche saine, la racine de la dent transmet les forces de mastication à la mâchoire, ce qui permet la préservation de l'os. En cas de perte d'une ou plusieurs dents, ces forces ne sont plus transmises et l'os peut se résorber lentement. En conséquence, les dents voisines peuvent se déplacer vers l'intérieur, créant de nouveaux espaces, comme illustré ci-dessous.



Fig. 1: Situation initiale



Fig. 2: Récession osseuse sur le long terme

Si vous perdez de nombreuses dents, l'ostéoporose et le changement de la forme du visage peuvent persister même après la mise en place de restaurations conventionnelles telles que les bridges ou les prothèses partielles. En revanche, le traitement avec des implants dentaires peut aider à prévenir la détérioration osseuse progressive décrite ci-dessus. En effet, les implants ont la même fonction que les racines des dents naturelles et transmettent donc les forces de mastication à l'os de la mâchoire de façon naturelle.



Fig. 3,4: Illustration symbolique de la détérioration osseuse de la mâchoire



## **UN INVESTISSEMENT POUR TOUTE LA VIE**

**ROBERT, 55 ANS  
HOMME D'AFFAIRES**

« De fausses dents à 55 ans ? Impensable pour moi. Pendant longtemps, j'ai eu un bridge à la mâchoire supérieure qui s'effondrait lentement car de plus en plus de dents étaient mobiles. Le dentiste a suggéré une prothèse amovible sans plaque qui serait fixée sur quatre implants. L'alternative était un set complet de prothèses dentaires avec une plaque de prothèse supérieure. Une fois que toutes mes dents supérieures ont été retirées, j'ai porté, pendant la phase de cicatrisation, une prothèse provisoire avec une plaque supérieure et mes pires craintes se sont confirmées : la plaque me rendait constamment malade et je ressentais des points de pression douloureux. La crème adhésive collait au palais, mais ne maintenait pas vraiment la prothèse en place. Je remarquais combien la nourriture était chaude que lorsqu'elle atteignait la gorge et ce n'était plus la peine d'acheter du vin cher, car il n'avait pas beaucoup de goût. A présent, avec ma prothèse sur implants, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie : il n'y a plus de points de pression, j'apprécie enfin de remanger dehors et mes nouvelles dents semblent jolies et attirantes. Je me sens par conséquent plus à l'aise et j'ai davantage confiance en moi. Je retire ma prothèse sur implants de ma bouche uniquement pour nettoyer mes dents correctement. À première vue, c'est beaucoup d'argent à dépenser, mais si je prends soin de mes nouvelles dents, elles dureront longtemps. J'espère qu'elles se révéleront un investissement pour la vie. »

# Traitement implantaire : une approche moderne et sûre.

Le traitement implantaire est une technique dentaire de pointe, testée scientifiquement et utilisée depuis une trentaine d'années par des dentistes et des chirurgiens qualifiés à travers le monde. Aujourd'hui, il permet de traiter presque tous les cas.



D'après les résultats d'une enquête réalisée en Allemagne<sup>1</sup>, 98% des patients interrogés étaient « satisfaits » ou « très satisfaits » de leurs implants dentaires.



Fig. 1: Illustration symbolique :  
a) dent naturelle b) couronne  
artificielle c) implant

## Une racine artificielle qui agit comme une racine naturelle

Lorsqu'une dent et sa racine sont manquantes, une couronne sur un implant dentaire est une solution esthétique et durable qui agit comme une dent naturelle. Un implant dentaire est une petite pièce solide, fabriquée avec des métaux, ou des céramiques, biocompatibles que l'on insère dans l'os de la mâchoire à la place de la racine de la dent manquante. Cet implant ou racine artificielle fait alors office de support pour la couronne ; il est inséré chirurgicalement sous anesthésie locale et sans hospitalisation. Selon la situation médicale du patient, une phase de cicatrisation de 6 semaines à quelques mois est nécessaire pour que l'implant soit solidement ancré dans l'os de la mâchoire (processus appelé ostéointégration).


Une fois cicatrisé, l'implant sert de base pour fixer des couronnes individuelles, des bridges de plusieurs unités ou des prothèses dentaires complètes.

# Prothèse conventionnelle ou implant ?

## Une grande différence.

Si une ou plusieurs dents doivent être remplacées, vous avez le choix entre une prothèse conventionnelle ou un traitement avec implants dentaires. Quelles sont les principales différences ?

**La solution avec bridge :** Avec un bridge conventionnel, les deux dents voisines saines à gauche et à droite de la dent manquante doivent être meulées pour soutenir le bridge. Cela se traduit par une perte de substance dentaire naturelle. De plus, le bridge ne transmet pas les forces de mastication à l'os de la mâchoire, ce qui peut également entraîner une détérioration de l'os.



Figures 1 à 3 : Bridge conventionnel à trois unités

« Les choses se sont améliorées en même temps que ma qualité de vie – une vraie bénédiction ! Et ces 17 dernières années, je n'ai eu aucun problème à parler ni à manger – ce qui m'ôte un gros tracas de l'esprit. » Ray, 75 ans

**La solution avec implant :** L'implant dentaire remplace la racine de la dent manquante et les dents voisines saines restent intactes, car il n'est pas nécessaire de les meuler.



Figures 4 à 6 : Remplacement d'une seule dent sur un implant



## POUR RÉSUMER : UN IMPLANT ...

### **... fait partie de vous même**

Même les meilleures prothèses seront toujours un corps étranger nécessitant un soin intensif. Au contraire, un implant dentaire est simplement une racine artificielle qui, lorsqu'il est intégré dans l'os et cicatrisé, agit comme la racine d'une dent naturelle.

### **... préserve votre sourire**

Fonctionnalité et apparence physique vont de paire : une restauration sur implant ressemble à une dent naturelle. Il n'y a tout simplement pas de différence visible et aucun soin supplémentaire n'est nécessaire.

### **... préserve votre structure faciale**

Les implants transmettent les forces de mastication aux os de la mâchoire. Cela n'est pas le cas si des dents manquent ou lorsqu'une prothèse conventionnelle a été mise en place. Si ces forces cessent, l'os peut se résorber lentement et la forme du visage changer au fil du temps.

### **... conserve vos dents saines**

Avec un bridge conventionnel, les dents voisines saines à droite et à gauche de la dent manquante doivent être meulées pour soutenir le bridge. En utilisant un implant pour combler l'espace, les dents voisines ne sont pas affectées et la substance dentaire naturelle reste intacte.





## UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

### Une dent manquante

Fig. 1 : L'implant dentaire remplace la racine de la dent manquante.



### Deux dents manquantes ou plus


Fig. 2 : Les implants servent de support au bridge.



## PROTHÈSES FIXES ET AMOVIBLES

### Bridge dentaire complet fixe : une solution séduisante et efficace aux nombreux avantages

Les dents manquantes de la mâchoire supérieure ou inférieure peuvent être remplacées par un bridge dentaire complet sur quatre implants dentaires ou plus. Seul le dentiste peut retirer la prothèse. Les implants assurent un support solide et durable pour le bridge comme pour les dents artificielles. Selon chaque cas, des bridges provisoires peuvent être mis en place le jour de l'intervention chirurgicale ou peu de temps après.




Figures 1 à 3 : Prothèse fixe en acrylique sur implants

« Je recommanderais sans hésiter un traitement par implant dentaire à l'un de mes amis ou à un membre de ma famille qui envisage cette solution. Les implants ont réellement changé ma vie. Il s'agit d'une procédure simple et définitive et non d'une solution dont il faudra toujours se soucier après la pose. »

Carly, 25 ans

### Prothèses amovibles : faciles à retirer pour l'hygiène bucco-dentaire quotidienne

Les prothèses dentaires sur implants peuvent offrir un meilleur ajustement et une plus grande stabilité par rapport aux prothèses conventionnelles. Les implants font office d'ancrage pour les éléments de rétention fixés sur la prothèse dentaire et, même s'il existe plusieurs systèmes et concepts de rétention différents, tous sont avantageux pour vous. La prothèse dentaire peut également être retirée facilement pour l'hygiène bucco-dentaire quotidienne.



Figures 5 à 6 : Prothèse amovible avec fixation LOCATOR® sur implants



Figures 7 à 9 : Prothèse dentaire avec barre sur implants

# Votre chemin vers un nouveau sourire peut être plus facile que vous ne l'imaginez.

Un diagnostic approfondi, une consultation individuelle et un traitement dentaire efficace sont les bases essentielles pour une restauration implanto-portée réussie.

## Exemple de délai de traitement moyen\*



### Étape 1 : Diagnostic et prise de décision

Après avoir réuni toutes les informations au moyen des radiographies dentaires, le dentiste étudie et évalue les options thérapeutiques qui vous conviennent le mieux. Les avantages et inconvénients des différentes solutions sont discutés ouvertement pour que vous soyez bien informé(e) sur tous les aspects de la procédure avant de prendre une décision.

### Étape 2 : Implantation – l'implant est inséré dans votre mâchoire

L'implant est habituellement inséré sous anesthésie locale. Le dentiste crée un « lit » adapté dans l'os de la mâchoire où il doit être inséré. Selon la situation de chaque patient, une restauration provisoire peut être mise en place sur l'implant pendant la phase de cicatrisation. Cela vous permet d'avoir un sourire qui semble naturel assez rapidement au cours du traitement.

\* La durée peut varier d'un cas à l'autre.

### **Étape 3 : Phase de cicatrisation – l’implant s’intègre dans votre os**

Il faut une période de cicatrisation de six semaines à quelques mois pour que l’implant soit solidement ancré dans l’os de la mâchoire. Ce délai dépend de la situation médicale de chaque individu. Au bout d’une semaine environ, les points de suture sont retirés. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse est cruciale pour une bonne cicatrisation.

### **Étape 4 : Vos nouvelles dents sont fabriquées au laboratoire dentaire**

Tandis que votre implant s’intègre à l’os au cours de la phase de cicatrisation, votre dentiste et son prothésiste dentaire entreprennent la création de votre dent sur mesure.

### **Étape 5 : Mise en place de la restauration définitive**

À la fin de la phase de cicatrisation, votre restauration définitive est connectée à l’implant, vous laissant ainsi la liberté de sourire, mordre et mâcher comme avant.

### **Étape 6 : Entretien – hygiène bucco-dentaire habituelle**

Une fois cicatrisé, l’implant fait partie de votre corps et, tout comme une dent naturelle, il nécessite des bilans réguliers et une hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Avec des soins normaux, mais appropriés, votre implant peut durer des dizaines d’années.






## Votre qualité de vie n'a pas de prix.

Votre santé est votre richesse. Les solutions implantaires renforcent la confiance en soi, offrent une meilleure qualité de vie, une meilleure santé bucco-dentaire et un nouveau sourire. Ces choses n'ont pas de prix. En revanche, des considérations financières sont à prendre en compte lorsqu'il s'agit de choisir entre des implants dentaires et des restaurations conventionnelles.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les prothèses dentaires conventionnelles ne sont pas toujours la solution ayant la meilleure rentabilité à long terme, comme le prouvent plusieurs études comparatives.

- Le remplacement d'une seule dent par une couronne sur implant dentaire améliore la qualité de vie et doit être considéré comme une option thérapeutique avec un bon rapport coût-efficacité comparé à un bridge conventionnel à trois éléments.<sup>1,2</sup>
- Le remplacement de plusieurs dents avec un traitement implantaire (prothèse fixe ou amovible) a un coût initial plus élevé par rapport à d'autres options thérapeutiques. Cependant les améliorations en terme de qualité de vie liées à la santé bucco-dentaire sont plus importantes.<sup>3</sup>



Graphique : au bout de 7 ans, le coût d'une restauration unitaire est amorti et le coût de la maintenance à long terme est inférieur à celui d'un bridge conventionnel.<sup>3</sup>

« Je recommanderais sans hésiter un implant plutôt que toute autre solution. Je crois que le prix effraie parfois les gens mais, sur le long terme, c'est vraiment le meilleur choix. »

Mary, 64 ans